

## **MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE REGLEMENTERING VAN DE VACCINATIE TEGEN PSEUDOVOGELPEST EN TOT WIJZIGING VAN HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 4 MEI 1992 HOUDENDE TIJDELIJKE MAATREGELEN TER BESTRIJDING VAN DE PSEUDOVOGELPEST 25.01.1993 (B.S. 26.01.1993)**

**Art. 1.** Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

- 1° Pluimvee: als huisdieren gehouden kippen, kalkoenen, parelhoenders, fazanten, kwartels, eenden, ganzen van gelijk welke leeftijd of geslacht;
- 2° Fokpluimvee: pluimvee van 72 uur en ouder, bestemd voor de productie van broedeieren;
- 3° Gebruikspluimvee: pluimvee van 72 uur en ouder, dat wordt opgefokt voor de productie van vlees en/of van consumptie-eieren of om in wild te worden uitgezet;
- 4° Eendagskuikens: pluimvee van alle soorten, dat nog geen 72 uur oud is en dat nog niet is gevoerd; muskuseenden mogen evenwel gevoerd zijn;
- 5° Broederij: bedrijf dat zich toelegt op het inleggen en uitbroeden van broedeieren en het opleveren van eendagskuikens;
- 6° Pluimveeselectiebedrijf: bedrijf dat zich toelegt op de productie van broedeieren bestemd voor de productie van fokpluimvee;
- 7° Vermeerderingsbedrijf: bedrijf dat zich toelegt op de productie van broedeieren bestemd voor de productie van gebruikspluimvee;
- 8° Opfokbedrijf: bedrijf dat zich toelegt op het opfokken van legpluimvee tot het legstadium;
- 9° Verantwoordelijke: diegene van de eigenaar of de houder, die gewoonlijk over het pluimvee een onmiddellijk beheer en toezicht uitoefent.

**Art. 2. § 1.** Elke verantwoordelijke van een bedrijf van meer dan 100 stuks pluimvee is verplicht een beroep te doen op een aangenomen dierenarts om al zijn pluimvee te laten inenten tegen de pseudovogelpest volgens de modaliteiten bepaald in artikel 4.

§ 2. Dezelfde verplichting wordt opgelegd voor de soorten:

- 1° patrijzen;
- 2° pauwen.

§ 3. Deze verplichting geldt niet voor de eenden, ganzen en dwergkwartels.

**Art. 3.** Voor zover fok- en gebruikspluimvee en eendagskuikens die werden ingevoerd, niet werden gevaccineerd tegen de pseudovogelpest, dient al dit pluimvee op kosten van de verantwoordelijke door een aangenomen dierenarts, binnen de 24 uur na aankomst op het bedrijf van bestemming, te worden gevaccineerd tegen pseudovogelpest.

**Art. 4. § 1.** De verplichte vaccinatie van het pluimvee en eendagskuikens bedoeld in artikelen 2 en 3 moet geschieden overeenkomstig de vaccinatieschema's en de methodes bepaald in bijlage bij dit besluit.

§ 2. Onverminderd de bepalingen van artikel 14, § 5, van het koninklijk besluit van 16 juli 1981 en van de voorgaande paragraaf kan de inspecteur-dierenarts in de beschermingsgebieden als bedoeld bij artikel 2, § 1, en artikel 3bis van het ministerieel besluit van 4 mei 1992 en de toezichtgebieden als bedoeld in artikel 3 van het ministerieel besluit van 4 mei 1992, de vaccinatie opleggen van andere vogelsoorten volgens de vaccinatieschema's en methodes vastgelegd door het Hoofd van de Dienst.

§ 3. Verantwoordelijken wiens pluimvee niet werd ingeënt overeenkomstig de vaccinatieschema's en -methoden bepaald in bijlage van dit besluit zijn ertoe gehouden om hun pluimvee te laten inenten binnen de acht dagen na inwerkingtreding van dit besluit.

**Art. 5.** De vaccinatie van het pluimvee gehouden op een bedrijf als bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 juni 1970 wordt verricht door de dierenarts bedoeld in artikel 2, punt 4°, van hetzelfde besluit.

**Art. 6.** De dierenarts belast met de inenting voert op het ogenblik van de inenting een klinisch onderzoek en een inventarisering uit van het aanwezige pluimvee en vult ter plaatse een register in. Dit register wordt door de verantwoordelijke bewaard gedurende één jaar na de laatste inschrijving. Bij elke gedagtekende inschrijving van een vaccinatie plaatst de dierenarts die verantwoordelijk is voor de enting zijn stempel en handtekening. Het register wordt gelijkgesteld met het entgetuigschrift bedoeld in artikel 17 van het koninklijk besluit van 16 juli 1981.

**Art. 7.** Behalve het doen voorleggen van het register of een inentingsgetuigschrift kan de inspecteur-dierenarts doen overgaan tot de opsporing van antistoffen.

**Art. 8.** Ontheffing op de verplichte inenting kan door de inspecteur-dierenarts worden toegestaan voor een bedrijf of een deel van een bedrijf:

- 1. aan de bedrijven die zijn erkend in toepassing van artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 juni 1970, indien:
  - de verantwoordelijke van het bedrijf de ontheffing heeft aangevraagd. Hij richt hiertoe een met redenen omkleed

verzoek aan de inspecteur-dierenarts;

- het bedrijf gelegen is op een afstand van ten minste 300 meter van enig ander pluimveebedrijf;
2. aan de erkende instellingen voor wetenschappelijk onderzoek.

**Art. 9.** Overtreding van de bepalingen van dit besluit wordt opgespoord, vastgesteld en gestraft overeenkomstig de hoofdstukken V en VI van de diergezondheidswet van 24 maart 1987.

**Art. 10.** Onverminderd de bepalingen van artikel 8 van het koninklijk besluit van 16 juli 1981 houdende maatregelen van gezondheidspolitie betreffende de vogelpest en de pseudovogelpest, verliest de verantwoordelijke die de bepalingen van dit besluit niet naleeft, elk recht op vergoeding.

**Art. 11.** § 1. Artikel 1, §§2 en 3, van het ministerieel besluit van 4 mei 1992 worden vervangen door de volgende bepaling:

“§2. Alle kippen bestemd voor de slacht uit eenzelfde productie-eenheid, moeten binnen een tijdsverloop van twee werkdagen na de eerste uitlading van het bedrijf worden weggehaald.”

§ 2. Artikel 1bis, §7, 7°, van het ministerieel besluit van 4 mei 1992 wordt vervangen door:

“7° de verkoper overhandigt aan de koper het origineel uit zijn register. Het vervoer van het verkocht pluimvee van de markt naar de bestemming gebeurt onder dekking van dit document.”

**Art. 12.** Dit besluit treedt in werking de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

## Bijlage

Inenting tegen pseudovogelpest.

### 1. Kippen.

#### 1.1. Professionele sector

##### 1.1.1°. Gebruikspluimvee

###### 1.1.1° 1) Slachtkuikens

1° enting:

tijdstip:

1° dag

keuze van het vaccin:

levend vaccin naar keuze

gebruikte methode:

grove spray - volle dosis

2° enting:

tijdstip:

op de leeftijd van 10 tot 18 dagen:

keuze van de vaccinstam:

La Sota stam of gekloneerde La Sota

gebruikte methode:

fijne spray of drinkwatermethode - volle dosis

###### 1.1.1° 2) Legkippen

1° enting:

tijdstip:

op de leeftijd van 10 tot 18 dagen op het opfokbedrijf.

keuze van de vaccinstam:

La Sota stam of gekloneerde La Sota stam

gebruikte methode:

fijne spray of drinkwatermethode - volle dosis

2° enting:

tijdstip:

op de leeftijd van 7 weken.

keuze van de vaccinstam:

La Sota stam of gekloneerde La Sota stam

gebruikte methode:

fijne spray of drinkwatermethode - volle dosis

3° enting:

tijdstip:

op het ogenblik van het overplaatsen

gebruikte methode:

enting door het onderhuids toedienen van een geïnactiveerd geadjuveerd vaccin

4° enting en volgende:

a. tijdens de legperiode is hervaccinatie verplicht wanneer een bloedonderzoek uitgevoerd bij een representatief aantal stuks legpluimvee heeft aangetoond dat het koppel onvoldoende immuniteit bezit. Een dergelijk bloedonderzoek moet worden uitgevoerd ten laatste 8 maanden na het begin van de leg.

b. van uitgeruide koppels:

gebruikte methode:

enting door het onderhuids toedienen van een geïnactiveerd geadjuveerd vaccin

vaccin

##### 1.1.2°. Reproductiesector

Pluimveeselectiebedrijven en vermeerderingsbedrijven in de categorie leg/vlees:

1° enting en volgende:

Zelfde schema en methode als beschreven voor de legkippen

### 1.2. Hobbysector:

Sierpluimvee dat te koop wordt aangeboden op een markt moet reeds gevaccineerd zijn binnen de drie maanden voorafgaand aan de verkoop.

herenentingen:

tijdstip:

juli - september

gebruikte methode:

enting door het onderhuids toedienen van een geïnactiveerd geadjuveerd vaccin

vaccin

### 2. Kalkoenen.

#### 2.1. Slachtkalkoenen

1° enting:

tijdstip:

op de leeftijd van 10 tot 18 dagen

keuze van de vaccinstam:

La Sota of gekloneerde La Sota

gebruikte methode:

fijne spray of drinkwatermethode - dubbele dosis

2° enting:

tijdstip:

op de leeftijd van 7 weken

keuze van de vaccinstam:

La Sota of gekloneerde La Sota

gebruikte methode:

fijne spray of drinkwatermethode - dubbele dosis

3° enting: (voor kalkoenen die langer dan 15 weken worden gehouden)

tijdstip:

op de leeftijd van 13 weken

keuze van de vaccinstam:

La Sota of gekloneerde La Sota

gebruikte methode: fijne spray of drinkwatermethode - dubbele dosis

## 2.2. Reproductiekalkoenen

1° enting:

tijdstip: op de leeftijd van 10 tot 18 dagen

keuze van de vaccinstam: La Sota of gekloneerde La Sota

gebruikte methode: fijne spray of drinkwatermethode - dubbele dosis

2° enting:

tijdstip: op de leeftijd van 8 tot 10 weken

keuze van de vaccinstam: La Sota of gekloneerde La Sota

gebruikte methode: fijne spray of drinkwatermethode - dubbele dosis

3° enting:

tijdstip: op de leeftijd van 17 weken

keuze van de vaccinstam: La Sota of gekloneerde La Sota

gebruikte methode: fijne spray of drinkwatermethode - dubbele dosis

4° en laatste enting:

tijdstip: op de leeftijd van 27 weken

gebruikte methode: enting door het onderhuids toedienen van een geïnactiveerd geadjuveerd vaccin

## 3. Parelhoenders.

### 3.1. Slachtparelhoenders:

1° enting:

tijdstip: op de leeftijd van 14 tot 21 dagen

keuze van de vaccinstam: La Sota of gekloneerde La Sota

gebruikte methode: fijne spray of drinkwatermethode - volle dosis

2° enting: voor parelhoenders die langer dan 12 weken worden doorgehouden:

tijdstip: op de leeftijd van 7 tot 9 weken:

keuze van het vaccin: La Sota stam of gekloneerde La Sota stam

gebruikte methode: fijne spray of drinkwatermethode - volle dosis

### 3.2. Reproductieparelhoenders

1° enting:

tijdstip: op de leeftijd van 14 tot 21 dagen

keuze van de vaccinstam: La Sota of gekloneerde La Sota

gebruikte methode: fijne spray of drinkwatermethode - volle dosis

2° enting:

tijdstip: op de leeftijd van 10 tot 12 weken

keuze van de vaccinstam: La Sota of gekloneerde La Sota

gebruikte methode: fijne spray of drinkwatermethode - volle dosis

3° enting:

tijdstip: op de leeftijd van 17 tot 18 weken

keuze van de vaccinstam: La Sota of gekloneerde La Sota

gebruikte methode: fijne spray of drinkwatermethode - volle dosis

4° enting:

tijdstip: op de leeftijd van 28 weken

gebruikte methode: enting door het onderhuids toedienen van een geïnactiveerd geadjuveerd vaccin

## 4. Fazanten en patrijzen.

### 4.1. Bestemd voor de slacht of voor de jacht:

1° enting: tijdstip: op de leeftijd van 2 tot 3 weken

keuze van de vaccinstam: La Sota of gekloneerde La Sota

gebruikte methode: drinkwatermethode - volle dosis

2° enting:

tijdstip: op de leeftijd van 8 tot 10 weken

keuze van de vaccinstam: La Sota of gekloneerde La Sota

gebruikte methode: drinkwatermethode - volle dosis

### 4.2. Bestemd voor de fokkerij:

1° enting:

tijdstip: op de leeftijd van 2 tot 3 weken

keuze van de vaccinstam: La Sota of gekloneerde La Sota

gebruikte methode: drinkwatermethode - volle dosis

2° enting:

tijdstip: op de leeftijd van 8 tot 10 weken  
keuze van de vaccinstam: La Sota of gekloneerde La Sota  
gebruikte methode: drinkwatermethode - volle dosis  
3° enting:  
tijdstip: op de leeftijd van 18 tot 20 weken  
gebruikte methode: enting door het onderhuids toedienen van een geïnactiveerd geadjuveerd vaccin

#### 5. Kwartels.

Met uitzondering van de dwergkwartels die worden gehouden als kleine volièrevogels en niet moeten worden gevaccineerd:

tijdstip: op de leeftijd van 5 tot 6 weken  
gebruikte methode: enting door het onderhuids toedienen van een geïnactiveerd geadjuveerd vaccin

#### 6. Andere Soorten

1° Pauwen:

1° enting:

tijdstip: op de leeftijd van 5 weken  
gebruikte methode: enting door het onderhuids toedienen van een geïnactiveerd geadjuveerd vaccin

2° enting en volgende:

jaarlijkse hervaccinatie tussen juli en september zoals de eerste enting.